

VAISTINIO PREPARATO EPINEFRINO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaistinio preparato epinefrino naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Šilutės r. Kintų pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla) bendrajame pirmosios pagalbos rinkinyje esančių epinefrino (adrenalino) autoinjektorių (švirkštiklių) įsigijimo, laikymo, apskaitos, kontrolės bei naudojimo anafilaksijos atveju tvarką.

2. Šis Aprašas privalomas visiems Mokyklos darbuotojams (pedagoginiams ir nepedagoginiams), vykdančioms mokinių bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą Mokyklos teritorijoje, jos prieigose bei Mokyklos organizuojamų renginių metu.

3. Mokyklos pirmosios pagalbos rinkinyje privaloma turėti epinefrino autoinjektorių, skirtų skirtingo kūno svorio asmenims:

3.1. ne mažiau kaip 1 vnt. epinefrino autoinjektoriaus, kurio dozė yra 150 µg (skirta vaikams, sveriantiems iki 30 kg);

3.2. ne mažiau kaip 1 vnt. epinefrino autoinjektoriaus, kurio dozė yra 300 µg (skirta vaikams ir suaugusiems, sveriantiems 30 kg ir daugiau).

4. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti savalaikį, saugų ir efektyvų pirmosios pagalbos suteikimą Mokyklos bendruomenės nariams bei ugdytiniams, ištikus gyvybei pavojingai ūmiai sisteminei alerginei reakcijai (anafilaksijai).

II SKYRIUS ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS

5. Už pirmosios pagalbos rinkinio papildymą, vaistinio preparato epinefrino laikymą, apskaitą ir savalaikį atnaujinimą Mokyklos vadovo įsakymu skiriamas atsakingas asmuo (toliau – Atsakingas asmuo).

6. Atsakingas asmuo (arba bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos specialistu, vykdančiu sveikatos priežiūrą Mokykloje):

6.1. ne rečiau kaip kartą per mėnesį atlieka vizualią epinefrino autoinjektorių kontrolę: tikrina pakuotės vientisumą, galiojimo terminus ir tirpalo skaidrumą (per tam skirtą kontrolinį langelį);

6.2. vykdo epinefrino autoinjektorių apskaitą specialioje registracijos formoje (žurnale), fiksuodamas vaistinio preparato seriją, galiojimo datą;

6.3. likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki epinefrino autoinjektoriaus galiojimo termino pabaigos, organizuoja naujo vaistinio preparato įsigijimą iš visuomenės vaistinės;

6.4. pasibaigusio galiojimo arba netinkamus naudoti epinefrino autoinjektorius nedelsiant išima iš pirmosios pagalbos rinkinio ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų pridavimą į visuomenės vaistinės arba perdavimą licencijuotiems tvarkytojams kaip farmacines atliekas;

6.5. visuomenės sveikatos specialistas, vykdančias sveikatos priežiūrą Mokykloje, teikia metodinę pagalbą ir instrukcijas Mokyklos darbuotojams apie ūmios sisteminės alerginės (anafilaksijos) atpažinimą bei techninį švirkštiklio panaudojimą.

7. Mokyklos pedagogai ir kiti darbuotojai (vykdančios vaikų priežiūrą):

7.1. privalo teisės aktų nustatyta tvarka būti išklause privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą, žinoti bendrojo pirmosios pagalbos rinkinio bei jame esančio epinefrino laikymo vietą Mokykloje;

7.2. atpažinę ūmios alerginės reakcijos (anafilaksijos) požymius, privalo veikti nedelsiant pagal šiame Apraše nustatytą pirmosios pagalbos teikimo algoritmą.

III. SKYRIUS

EPINEFRINO ĮSIGIJIMAS, LAIKYMAS IR APSKAITOS TVARKA

8. Epinefrino įsigijimas:

8.1. mokyklos bendrajam pirmosios pagalbos rinkiniui skirti epinefrino autoinjektoriai įsigijami tik iš licencijuotų visuomenės vaistinių;

8.2. griežtai draudžiama įsigyti, priimti ar bendrajame rinkinyje laikyti epinefrino autoinjektorius iš neaiškių šaltinių ar trečiųjų asmenų;

8.3. jei mokinys serga lėtine alergija ir turi gydytojo paskirtą asmeninį epinefrino švirkštiklį, jį Mokyklai pateikia tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su gydytojo rekomendacijomis, ir šis vaistas laikomas atskirai nuo bendrojo rinkinio.

9. Laikymo sąlygos:

9.1. epinefrino autoinjektoriai privalo būti laikomi originalioje išorinėje pakuotėje (kartoninėje dėžutėje), kad vaistinė medžiaga būtų apsaugota nuo tiesioginės šviesos poveikio;

9.2. vaistinis preparatas laikomas sausoje vietoje, kontroliuojamoje temperatūroje, ne aukštesnėje kaip 25 °C aplinkoje;

9.3. griežtai draudžiama epinefrino autoinjektorius šaldyti, užšaldyti ar palikti tiesioginių saulės spindulių poveikio zonoje;

9.4. bendrasis pirmosios pagalbos rinkinys su epinefrinu laikomas aiškiai paženklintoje, matomoje ir saugioje vietoje, kuri yra žinoma visiems darbuotojams ir prireikus pasiekama sekundžių tikslumu (pvz., medicinos kabinete, raštinėje ar pas budintį darbuotoją);

9.5. epinefrino laikymo vieta privalo būti nepasiekiamą mokiniams bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, siekiant išvengti savavališko ar netyčinio vaisto panaudojimo.

10. Apskaitos ir kontrolės tvarka:

10.1. kiekvienas į Mokyklą pristatytas epinefrino autoinjektorius registruojamas Vaistinių preparatų apskaitos žurnale (Priedas Nr. 1);

10.2. žurnale privaloma fiksuoti šiuos duomenis: įsigijimo datą, vaistinio preparato pavadinimą, dozę (150 µg arba 300 µg), serijos numerį (Lot), pagaminimo ir galiojimo pabaigos datas (Exp) bei už įrašą atsakingo asmens parašą;

10.3. kas mėnesinės vizualios patikros rezultatai (pakuotės sandarumas, tirpalo skaidrumas) ir patikrinimą atlikusio asmens parašas fiksuojami tam skirtoje Vaistinių preparatų apskaitos žurnalo skiltyje.

IV SKYRIUS

PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO IR EPINEFRINO NAUDOJIMO TVARKA (VEIKSMŲ ALGORITMAS ANAFILAKSIJOS ATVEJU)

11. Anafilaksijos atpažinimas:

11.1. mokyklos darbuotojai privalo nedelsdami reaguoti, jei po kontakto su galimu alergenu (pvz., maistu, vabzdžio įgėlimu, vaistais) mokiniui ar vaikui staigiai (per kelias minutes ar valandas) išsivysto šie požymiai:

11.1.1. kvėpavimo sistemos sutrikimai: dusulys, sunkus ar švokščiantis kvėpavimas, gerklės veržimo jausmas, balso užkimimas, nuolatinis kosulys;

11.1.2. kraujotakos sistemos sutrikimai: staigus odos blyškumas, lūpų ar nagų mėlynnavimas, silpnas ir dažnas pulsas, galvos svaigimas, sąmonės praradimas;

11.1.3. odos ir gleivinių pakitimai: viso kūno bėrimas (dilgėlinė), niežulys, veido, lūpų, liežuvio ar akių vokų patinimas.

12. Veiksmų seka ištikus anafilaksijai:

12.1. skubus pagalbos iškvietimas: Pirmasis anafilaksiją pastebėjęs darbuotojas (arba jo paprašytas kitas asmuo) nedelsdamas skambina skubiosios pagalbos tarnybų telefonu **112**. Operatoriams būtina aiškiai pasakyti: „*Mokykloje vaikui įtariama anafilaksija (sunki alerginė reakcija), reikalinga greitoji medicinos pagalba, bus leidžiamas epinefrinas*“.

12.2. vaisto paėmimas: nedelsiant iš bendrojo pirmosios pagalbos rinkinio (arba asmeninių vaisto atsargų, jei vaikas turi individualų švirkštiklį) paimamas nukentėjusiojo svorį atitinkantis epinefrino autoinjektorius (150 µg – iki 30 kg; 300 µg – nuo 30 kg ir suaugusiems).

13. Epinefrino suleidimo technika:

13.1. suimti dominuojančia ranka (kumsčiu) per vidurį taip, kad adata nukreiptas galas (dažniausiai juodas arba oranžinis) būtų nukreiptas žemyn. Niekada nedėti nykščio ant autoinjektoriaus galų;

13.2. kita ranka tiesiu judesiu suimti apsauginį saugos dangtelį (dažniausiai mėlynos ar pilkos spalvos);

13.3. tvirtu ir greitu judesiu stačiu (90 laipsnių) kampu prispausti arba suduoti autoinjektoriaus adatą turinčiu galu į **išorinę šlaunies pusę (vidurinę trečdalį)**. Vaistą galima leisti tiesiai per drabužius, jei nėra itin stori (pvz., vengti storų odinių rūbų ar daiktų kišenėse);

13.4. pasigirdus spragtelėjimui (tai reiškia, kad adata suveikė), **laikyti autoinjektorių tvirtai prispaustą prie šlaunies tiksliai 3–10 sekundžių** (priklausomai nuo konkretaus gamintojo instrukcijos, pvz., „EpiPen“ – 3 sekundes), kad būtų suleista visa vaisto dozė;

13.5. atitraukus švirkštiklį, suleidimo vietą švelniai masažuoti apie 10 sekundžių;

13.6. užfiksuoti tikslų suleidimo laiką.

14. Nukentėjusiojo priežiūra po suleidimo:

14.1. paguldyti nukentėjusįjį ant nugaros ir pakelti jo kojas aukščiau širdies lygio (kas pagerėtų kraujotaka);

14.2. jei nukentėjusiam sunku kvėpuoti arba jis vemia, leisti jam atsisėsti arba paguldyti į stabilią šoninę padėtį. Nepalikti vaiko vieno nė vienai sekunde;

14.3. jei po pirmosios dozės suleidimo per 5-12 minučių būklė nepagerėja arba blogėja, o greitoji medicinos pagalba dar neatvyko, galima suleisti antrąją epinefrino dozę iš kito autoinjektoriaus;

14.4. panaudotą autoinjektorių saugiai atiduoti atvykusiai greitosios medicinos pagalbos brigadai, nurodant tikslų vaisto suleidimo laiką

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

16. Visi Mokyklos darbuotojai su šiuo Aprašu supažindinami elektroninėmis priemonėmis teisės aktų nustatyta tvarka ir privalo laikytis jame nurodytų reikalavimų.

[illegible]